
DS5 (version A)

Problème 1

Partie I : Etude d'une matrice A

On considère la matrice carrée $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

1. a) On compile le code **Python** suivant :

```
1 import numpy as np
2 import numpy.linalg as al
3 A = np.array([[2,-2,2],[1,1,2],[-2,0,-3]])
4 print(al.matrix_power(A,3))
```

et on obtient l'affichage :

```
1 [[ 2 -2  2]
2  [ 1  1  2]
3  [-2  0 -3]]
```

Traduire ce résultat par une égalité entre deux matrices.

b) En déduire les valeurs propres possibles de A .

2. a) Déterminer $\text{Sp}(A)$ et une base de chacun des sous-espaces propres de A .

b) Démontrer qu'il existe une matrice $P \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ inversible, dont la première ligne est $(2 \ 3 \ -2)$, et une matrice $D \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ diagonale, dont les coefficients diagonaux sont dans l'ordre croissant, qui vérifient $A = PDP^{-1}$. On explicitera les matrices P et D .

Partie II : Exponentielle d'une matrice carrée

Si $(a_n), (b_n), (c_n), (d_n), (e_n), (f_n), (g_n), (h_n), (i_n)$ désignent neuf suites convergentes, de limites respectives $a, b, c, d, e, f, g, h, i$, et si $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par

$$M_n = \begin{pmatrix} a_n & b_n & c_n \\ d_n & e_n & f_n \\ g_n & h_n & i_n \end{pmatrix},$$

on dit que la suite de matrices $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite coefficient par coefficient, et on le note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad M_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$$

Si $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on pose, pour tout entier naturel n ,

$$S_n(M) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} M^k.$$

Lorsque $(S_n(M))_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite coefficient par coefficient, on note e^M cette limite.

3. Deux résultats théoriques. On utilisera les notations du préambule de la partie II pour les preuves.

a) Soit $M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et soit (α_n) une suite réelle convergente, de limite ℓ . Montrer que la suite de matrices $(\alpha_n M)$ admet une limite coefficient par coefficient et que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n M = \ell M$$

b) Soient (M_n) et (M'_n) deux suites de matrices de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ qui admettent chacune une limite coefficient par coefficient. On note $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = M$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} M'_n = M'$. Montrer que les suites de matrices $(M_n + M'_n)$ et $(M_n M'_n)$ admettent chacune une limite coefficient par coefficient et que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n + M'_n = M + M' \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} M_n M'_n = M M'$$

Les candidat-es devront référer précisément à ces questions lorsque ces résultats seront utilisés.

4. Montrer que, si $D = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$, alors e^D existe et vaut $e^D = \begin{pmatrix} e^a & 0 & 0 \\ 0 & e^b & 0 \\ 0 & 0 & e^c \end{pmatrix}$.

Ainsi, on a montré que l'exponentielle d'une matrice diagonale est une matrice diagonale.

5. Dans cette question uniquement, la matrice M est donnée par $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculer M^2 et M^3 . En déduire la matrice M^k pour tout entier naturel k .

b) Donner, pour tout entier n supérieur ou égal à 2, l'expression de $S_n(M)$. En déduire l'existence et l'expression de la matrice e^M .

6. Dans cette question uniquement, la matrice M est donnée par $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculer M^2 et M^3 en fonction de M .

b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Conjecturer une formule simple pour l'expression de M^k puis la démontrer par récurrence.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$S_n(M) = I + \frac{1}{3} \left(\sum_{k=0}^n \frac{3^k}{k!} - 1 \right) M$$

d) En déduire que e^M existe et que

$$e^M = I + \frac{e^3 - 1}{3} M$$

7. Dans cette question, on considère la matrice A de la Partie I et on fixe un réel t .

a) Déduire de la question 2.b) que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(tA) = P S_n(tD) P^{-1}$$

b) Conclure que e^{tA} existe et en donner une expression sous la forme $e^{tA} = P \Delta(t) P^{-1}$.

On explicitera la matrice $\Delta(t)$ sous forme de tableau matriciel en fonction de t .

En généralisant ce résultat, on montre alors que l'exponentielle d'une matrice diagonalisable est une matrice diagonalisable (on ne demande pas de le faire).

Partie III : Etude d'un système différentiel linéaire

On considère le système différentiel linéaire suivant :

$$(S) : \begin{cases} x'(t) = 2x(t) - 2y(t) + 2z(t) \\ y'(t) = x(t) + y(t) + 2z(t) \\ z'(t) = -2x(t) - 3z(t) \end{cases}$$

où les inconnues x, y, z sont des fonctions de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} . Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on note $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$.

8. Montrer que X est solution de (S) si et seulement si, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X'(t) = AX(t)$, où A est la matrice étudiée dans la partie I.
9. Déterminer l'ensemble des états d'équilibre du système différentiel linéaire (S) .
10. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ et soient X et Y deux solutions de (S) . On suppose que $X(t_0) = Y(t_0)$. Que peut-on en déduire sur X et Y ?
11. Montrer que les solutions de (S) sont de la forme

$$X(t) = \alpha e^{-t}U_{-1} + \beta U_0 + \gamma e^t U_1, \quad (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$$

$$\text{où } U_{-1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, U_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \text{ et } U_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

12. On considère dans cette question deux problèmes de Cauchy :

$$(\mathcal{P}_1) : \begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(0) = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix} \end{cases} \quad \text{et} \quad (\mathcal{P}_2) : \begin{cases} X'(t) = AX(t) \\ X(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

- a)
 - i) Déterminer l'unique solution du problème de Cauchy (\mathcal{P}_1) , que l'on notera X_1 .
 - ii) Montrer que la trajectoire associée à la solution X_1 est convergente. Expliciter le point limite (ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3) . Quelle propriété possède ce point limite vis-à-vis du système différentiel linéaire (S) ?
 - b)
 - i) Déterminer l'unique solution du problème de Cauchy (\mathcal{P}_2) , que l'on notera X_2 .
 - ii) Montrer que la trajectoire associée à la solution X_2 est divergente.
 - c) On a représenté page suivante les tracés de 4 solutions du système différentiel linéaire (S) . Dire quels sont les tracés associés aux solutions X_1 et X_2 étudiées ci-dessus. On justifiera les réponses.
13. Dans cette question, on souhaite faire le lien entre la résolution d'un système différentiel linéaire (homogène) et l'exponentielle de matrice introduite à la partie II.
- a) On fixe $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ et on considère la solution de (S) :

$$X(t) = \alpha e^{-t}U_{-1} + \beta U_0 + \gamma e^t U_1$$

On pose $C = P \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$. Montrer que, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $X(t) = e^{tA}C$.

- b) Commenter le résultat obtenu à la question précédente, au regard des résultats du cours sur les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant.




FIG. 1 Tracé 1




FIG. 2 Tracé 2




FIG. 3 Tracé 3




FIG. 4 Tracé 4

Exercice 2

1. On pose f la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

a) Montrer que f est une densité de probabilité.

Dans la suite de cette question, on note X une variable aléatoire admettant f pour densité.

b) Déterminer la fonction de répartition F_X de X .

c) On pose $Y = X^2$. Déterminer la fonction de répartition de Y . Reconnaître la loi de Y .

2. On pose g la fonction définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \begin{cases} \alpha x^{-4} & \text{si } x \geq 1 \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

a) Pour quelle valeur de α la fonction g est une densité de probabilité ?

Dans la suite de cette question, on suppose que α prend cette valeur et on note Z une variable aléatoire admettant g pour densité.

b) Déterminer la fonction de répartition F_Z de Z .

c) On pose $W = -2Z + 1$. Déterminer la fonction de répartition de W puis montrer que W est une variable aléatoire à densité et expliciter une densité de W .

Exercice 3

Dans tout cet exercice, f désigne la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$\forall x \in]0, +\infty[, f(x) = x - \ln(x)$$

Partie I : Étude de la fonction f

1. Dresser le tableau de variations de f en précisant ses limites en 0 et en $+\infty$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 2$, d'inconnue $x \in]0, +\infty[$, admet exactement deux solutions, que l'on note a et b , telles que $0 < a < 1 < b$.
3. Montrer : $b \in [2, 4]$. On donne : $\ln(2) \simeq 0,7$.

Partie II : Étude d'une fonction définie par une intégrale

On note Φ la fonction donnée par :

$$\Phi(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{f(t)} dt$$

4. Montrer que Φ est bien définie et dérivable sur $]0, +\infty[$, et que l'on a :

$$\forall x \in]0, +\infty[, \Phi'(x) = \frac{\ln(2) - \ln(x)}{(x - \ln(x))(2x - \ln(2x))}$$

5. En déduire les variations de Φ sur $]0, +\infty[$.
6. Montrer : $\forall x \in]0, +\infty[, 0 \leq \Phi(x) \leq x$.
7. **a)** Montrer que Φ est prolongeable par continuité en 0 (*i.e.* Φ admet une limite finie en 0).
On note encore Φ la fonction ainsi prolongée. Préciser alors $\Phi(0)$.
b) Montrer : $\lim_{x \rightarrow 0} \Phi'(x) = 0$.
On admet que la fonction Φ est alors dérivable en 0 et que $\Phi'(0) = 0$.
8. On donne $\Phi(2) \simeq 1,1$ et on admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = \ln(2) \simeq 0,7$.
Tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction Φ . On fera apparaître en particulier les tangentes et demi-tangentes remarquables.