

Exercice 1 : Soit $f : x \mapsto e^x + x^2 + x$. On admet que f est continue et strictement croissante sur \mathbb{R}^+ et que $f(0) < e < f(1)$. Ainsi, d'après le théorème de la bijection, il existe un unique $\alpha \in [0, 1]$ tel que $f(\alpha) = e$.

Compléter le programme **Python** suivant pour qu'il affiche une valeur approchée de α à 10^{-5} près.

```

1  a,b = _____
2  while _____
3      c = (a+b)/2
4      if _____
5          b = c
6      else:
7          a = c
8  print((a+b)/2)

```

Exercice 2 : Soit $g : x \mapsto x^3 + 3x^2 - 2x - 1$. On admet que g est continue et strictement décroissante sur $[-1, 0]$ et que $g(-1) > 0 > g(0)$. Ainsi, d'après le théorème de la bijection, il existe un unique $\beta \in [-1, 0]$ tel que $g(\beta) = 0$.

1. Compléter la fonction **Python** suivante pour qu'elle prenne en entrée un réel x et qu'elle renvoie $g(x)$.

```

1  def g(x):
2      return _____

```

2. Compléter le programme **Python** suivant pour qu'il trace le graphe de g sur $[-1, 0]$.

```

1  X = _____
2  Y = _____
3  plt.plot_____

```

3. Compléter la fonction **Python** suivante pour qu'elle renvoie une valeur approchée de β à eps près (où $\text{eps} > 0$).

```

1  def approx(eps):
2      a,b = _____
3      while _____
4          c = (a+b)/2
5          if _____
6              b = c
7          else:
8              a = c
9      return (a+b)/2

```